

Apprenez à reconnaître...

INSECTARIUM
DE MONTRÉAL



HÔPITAL
SAINTE-JUSTINE
Le centre hospitalier
universitaire mère-enfant

Pour l'amour des enfants

Université
de Montréal

une GUÊPE



Silhouette élancée
Taille très fine
Corps lisse (faible pilosité)
Pattes effilées
Longueur : de 10 à 25 mm
Une guêpe peut piquer plusieurs fois :
son dard est lisse.

Parmi toutes les espèces de guêpes présentes au Québec, seulement une vingtaine sont sociales. Pour loger la colonie, ces guêpes fabriquent un nid de « papier » ou guêpier en mastiquant des fibres de bois qui, mélangées à leur salive, forment une pâte.

Les guêpes *Dolichovespula*

La guêpe à taches blanches, *Dolichovespula maculata*, se reconnaît à ses taches beiges ou blanc ivoire. Elle tourne rarement autour de notre nourriture et est peu portée à piquer.

Un guêpier de *Dolichovespula* :
un nid aérien, suspendu
à une corniche.



une ABEILLE domestique



Silhouette peu élancée
Taille peu apparente
Corps velu
Pattes dotées de corbeilles à pollen
Longueur : 12 mm (ouvrière)
Une abeille domestique ne peut piquer qu'une fois :
son dard muni de crochets ne peut pas ressortir de
la peau. En outre, elle meurt après la piqûre.

Il existe plusieurs espèces d'abeilles au Québec, dont la plupart sont solitaires. Toutefois, l'espèce la plus connue, l'abeille domestique, est sociale : cet insecte aux mœurs fascinantes construit un nid de cire, qu'il installe volontiers dans la ruche que lui offre l'apiculteur.

Que ce soit en milieu urbain ou agricole, les abeilles domestiques piquent rarement et ne sont pas attirées par notre nourriture. Elles butinent plutôt d'une fleur à l'autre, récoltant ainsi de grandes quantités de nectar qu'elles transformeront en miel, dont la colonie se nourrira l'hiver.

Une colonie d'abeilles vit plusieurs années et peut se reproduire par essaimage. Si vous observez un essaim, ne le dérangez pas. Contactez les autorités locales.



un BOURDON



Silhouette trapue
Taille peu apparente
Corps très velu (aspect de peluche)
Pattes dotées de corbeilles à pollen
Longueur : de 6 à 25 mm
Un bourdon peut piquer plusieurs fois :
son dard est lisse.

Au Québec, il existe une vingtaine d'espèces de bourdons, toutes sociales. La reine installe son nid dans divers types de cavités — le plus souvent souterraines, comme un ancien trou de rongeur ou le creux d'un muret. Ce nid est fait d'alvéoles de cire en forme de petits pots.

Les bourdons butinent les fleurs et ne sont pas attirés par notre nourriture. Ils piquent exceptionnellement à moins qu'ils ne soient dérangés à leur nid.

Nid de bourdon fébrile,
Bombus impatiens

