

Les guêpes *Vespula*

Deux guêpes d'apparence très semblable, à la robe noire et jaune vif, sont à **surveiller** de près : insectes charognards, elles explorent volontiers nos assiettes et nos poubelles et n'hésitent pas à piquer quand elles se sentent dérangées. En outre, pour installer leur nid, elles utilisent un trou existant — ancien terrier, dépression du sol, ouverture dans un mur, etc. Le nid se trouve ainsi **caché**, avec les risques que cela comporte de marcher dedans !



La guêpe germanique, *Vespula germanica*



La guêpe commune, *Vespula vulgaris*

Échange de nourriture entre des ouvrières



Apiculteur travaillant à une ruche. Chaque rayon du nid est fait de milliers d'alvéoles de forme hexagonale, qui contiennent le couvain et les réserves alimentaires.



Appartenant au grand groupe des abeilles, le bourdon fébrile est répandu en milieu urbain. Celui-ci est noir et jaune, comme la plupart des bourdons, mais certaines espèces affichent aussi de l'orangé.

Les guêpes *Polistes*

Noire et jaune ou marron, et particulièrement élancée, la guêpe poliste est peu encline à s'approcher de notre nourriture et à piquer. Elle fabrique un petit nid aérien en forme de parasol inversé, qu'elle fixe à une branche ou à une corniche.



La guêpe poliste, *Polistes fuscatus*



Poliste



Bourdon terricole



Halicte

Les guêpes et abeilles SOLITAIRES

Beaucoup de guêpes et la plupart des abeilles appartiennent à des espèces dites solitaires, c'est-à-dire qui ne vivent pas en colonies. Il n'y a alors ni reines, ni ouvrières, juste des mâles et des femelles. Même si ces insectes peuvent piquer pour se défendre, ils sont peu portés à le faire et ne sont guère intéressés par notre nourriture.

Quelqu'un a été piqué ? **GARDEZ VOTRE CALME** et faites ce qui suit.

Rassurez la personne piquée.
Agissez rapidement.
Au besoin, appelez le 911.

Examinez la zone piquée

Chez la plupart des personnes, il y aura rougeur, douleur, chaleur et gonflement **autour du site de la piqûre**. Cette réaction est normale, et même si elle peut sembler très inquiétante, elle disparaîtra dans les heures ou les jours suivants. Appliquez simplement des compresses froides et prenez un médicament pour contrôler la douleur (acétaminophène). Toutefois, si les réactions locales sont très étendues ou accompagnées de fièvre ou d'infection locale, consultez un médecin.

Quand faut-il s'inquiéter ?

La réaction devient anormale et inquiétante lorsqu'elle se manifeste ailleurs qu'au site de la piqûre. Les signes d'une réaction grave sont les suivants : enflure au visage, urticaire (rougeur) généralisée, changement de la voix, difficulté à avaler ou à respirer, crise d'asthme, faiblesse, vomissements persistants, perte de conscience ou état de choc. Une telle réaction peut survenir quelques minutes à peine après la piqûre et mettre votre vie en danger. Si un ou plusieurs de ces symptômes sont présents, agissez rapidement : administrez l'EpiPen® (disponible en pharmacie sans prescription), prenez un antihistaminique (Benadryl®) et présentez-vous au service d'urgence le plus proche. Au besoin, appelez le 911.

Les personnes ayant subi une réaction allergique suite à une piqûre de guêpe, d'abeille ou de bourdon ont 60 % de risque d'en subir **une autre semblable ou pire** si elles sont piquées de nouveau par la même espèce. Vous avez déjà observé un ou plusieurs signes d'allergie suite à une piqûre d'insecte ? Parlez-en à votre médecin.

Par ailleurs, il existe un traitement de désensibilisation au venin d'abeille ou de guêpe, efficace à 97 %. Si vous avez déjà éprouvé de fortes réactions suite à une piqûre d'insecte, consultez un allergologue.